

Literaturverzeichnis Lohfert-Preis:

Elektronische Symptom- und Bedarfserfassung und patientenzentrierte Einbindung der palliativen Versorgung in onkologische Behandlungsprozesse

1. Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht-heilbaren Krebserkrankung, Langversion 2.0. [Online] 2019. [Zitat vom: 17. Feb 2020.] <https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/palliativmedizin/>.
2. Baratelli C, Turco CGC, Lacidogna G, Sperti E, Vignani F, Marino D, Zichi C, De Luca E, Audisio M, Ballaminut D, Bellezza A, Chiotto P, Ciriolo G, Comite R, Codegone F, Florio S, Fusco L, Polimeno L, Pozzi D, Zilio E, Terzolo S, Di Maio M. The role of patient-reported outcomes in outpatients receiving active anti-cancer treatment: impact on patients' quality of life. *Support Care Cancer*. Dec 2019, 27(12):4697-4704.
3. *Overall Survival Results of a Trial Assessing Patient-Reported Outcomes for Symptom Monitoring During Routine Cancer Treatment*. Basch E, Deal AM, Dueck AC, Scher HI, Kris MG, Hudis C, Schrag D. 11. Jul 2017, *JAMA*, 318(2):197-198.
4. Roch C, Heckel M, van Oorschot B, Alt-Epping B, Tewes M. Screening for palliative care needs – Pilot data from German Comprehensive Cancer Centers. *JCO Oncol Pract*. 11. Feb 2021, S. ahead of print.
5. Stiel S, Matthes ME, Bertram L, Ostgathe C, Elsner F, Radbruch L. Validierung der neuen Fassung des Minimalen Dokumentationssystems (MIDOS2) für Patienten in der Palliativmedizin. Deutsche Version der Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). *Schmerz*. Dec 2010, 24(6):596-604.
6. Kroenke K, Spitzer RL, Williams JB. The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. *J Gen Intern Med*. 2001, 16:606–13.
7. Rumpold G, Augustin M, Zschocke I, Strittmatter G, Söllner W. Die Validität des Hornheider Fragebogens zur psychosozialen Unterstützung bei Tumorkranken. *Psychother Psychosom Med Psychol*. Jan 2001, 51(1):25-33.
8. Tewes M, Rettler TM, Beckmann M, Scheer K, Ritterbusch U, Schuler M, Hense J. Patient-Reported Outcome-Messung (PROM) psychosozialer Belastung und Symptome für ambulante Patienten unter kurativer oder palliativer Tumorthherapie. *Der Onkologe*. Jan 2018, 69–75.
9. Tewes M, Rettler T, Wolf N, Hense J, Schuler M, Teufel M, Beckmann M. Predictors of outpatients' request for palliative care service at a medical oncology clinic of a German comprehensive cancer center. *Support Care Cancer*. Oct 2018, 26(10):3641-3647.
10. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA, Dahlin CM, Blinderman CD, Jacobsen J, Pirl WF, Billings JA, Lynch TJ. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med*. 19. Aug 2010, 363(8):733-42.
11. Hui D, Masanori M, Watanabe S, Caraceni A, Strasser F, Saarto T, Cherny N, Glare P, Kaasa S, Bruera E. Referral criteria for outpatient specialty palliative cancer care: an international consensus. *Lancet Oncol*. Dec 2016, 17(12):e552-e559.

12. Frikkel J, Götte M, Beckmann M, Kasper S, Hense J, Teufel M, Schuler M, Tewes M. Fatigue, barriers to physical activity and predictors for motivation to exercise in advanced Cancer patients. *BMC Palliat Care*. 31. Mar 2020, 19(1):43.

13. Frikkel J, Beckmann M, De Lazzari N, Götte M, Kasper S, Hense J, Schuler M, Teufel M, Tewes M. Increase of fatigue and depression along with changes in barriers and predictors towards physical activity in advanced cancer patients. *Support Care Cancer*. 2021, accepted.